



**MIGUEL RODRIGO**  
UROLOGÍA

Dr. Miguel Rodrigo Aliaga  
C/ Alicante 25.  
12004. Castellón de la Plana.

☎ 964 10 48 40 (IVU)

[www.rodrigourologo.es](http://www.rodrigourologo.es)  
[info@rodrigourologo.es](mailto:info@rodrigourologo.es)

## **DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: INYECCION DE BOTOX INTRAVESICAL**

### **¿CÓMO ME TENGO QUE PREPARAR PARA LA INTERVENCIÓN?**

En caso de que tome algún tratamiento antiagregante para la circulación de la sangre (aspirina, AAS, adiro, clopidogrel, plavix, iscover, duoplavin, pletal, tromalyt, etc) es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa a la intervención.

En el caso de que tome sintrom, pradaxa, eliquis o algún otro tipo de tratamiento anticoagulante para la sangre, igualmente es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa a la intervención.

El día del ingreso, acudirá en AYUNAS al mostrador principal del Hospital Vithas Rey Don Jaime donde le asignarán cama de hospitalización.

### **¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE MI ESTANCIA EN EL HOSPITAL DESPUES DE LA INTERVENCIÓN?**

El día de la intervención: Tras la cirugía pasará a la sala de hospitalización donde podrá iniciar una dieta líquida y progresivamente sólida.

Llevará una sonda vesical al salir de quirófano, que será retirada tras un tiempo prudencial. Aunque no es lo habitual, a veces puede ser aconsejable irse a casa con la sonda vesical.

Generalmente no es necesario hacer noche en el hospital.



**MIGUEL RODRIGO**  
UROLOGÍA

Dr. Miguel Rodrigo Aliaga  
C/ Alicante 25.  
12004. Castellón de la Plana.

☎ 964 10 48 40 (IVU)

[www.rodrigourologo.es](http://www.rodrigourologo.es)  
[info@rodrigourologo.es](mailto:info@rodrigourologo.es)

## **¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR EN MI DOMICILIO DESPUES DE LA INTERVENCION?**

Este tipo de intervención no requiere cuidados especiales salvo que aparezcan complicaciones, como podrían ser: infección o retención de orina. Podrá realizar la actividad habitual. Se recomienda aumentar en los días sucesivos la ingesta de agua. Puede presentar sangre en la orina en el postoperatorio pero no es necesario tratamiento alguno salvo aumentar la ingesta de agua.

En caso de presentar imposibilidad para orinar, deberá acudir a Urgencias, pudiendo requerir sondaje vesical. De igual modo, si presenta fiebre de 38°C o más deberá acudir a urgencias.

Todas estas recomendaciones aquí reflejadas son genéricas y puede que no sean las adecuadas para su caso en particular. Por todo ello, en el informe del alta hospitalaria es donde se redactarán las recomendaciones específicas que usted deberá seguir una vez esté en su domicilio.