



**MIGUEL RODRIGO**  
UROLOGÍA

Dr. Miguel Rodrigo Aliaga  
C/ Alicante 25.  
12004. Castellón de la Plana.

☎ 964 10 48 40 (IVU)

[www.rodrigourologo.es](http://www.rodrigourologo.es)  
[info@rodrigourologo.es](mailto:info@rodrigourologo.es)

## **DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: CIRUGÍA DE LA INCONTINENCIA MASCULINA (SLING SUBURETRAL)**

### **¿CÓMO ME TENGO QUE PREPARAR PARA LA INTERVENCIÓN?**

En caso de que tome algún tratamiento antiagregante para la circulación de la sangre (aspirina, AAS, adiro, clopidogrel, plavix, iscover, duoplavin, pletal, tromalyt, etc) es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa a la intervención.

En el caso de que tome sintrom, pradaxa, eliquis o algún otro tipo de tratamiento anticoagulante para la sangre, igualmente es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa a la intervención.

Es recomendable realizar un urinocultivo (análisis de orina) unos días antes de la intervención.

El día del ingreso, acudirá en AYUNAS al mostrador principal del Hospital Vithas Rey Don Jaime donde le asignarán cama de hospitalización.

### **¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE MI ESTANCIA EN EL HOSPITAL DESPUES DE LA INTERVENCIÓN?**

El día de la intervención: Tras la cirugía pasará a la sala de hospitalización donde podrá iniciar una dieta líquida y progresivamente sólida. En cuanto tolere la dieta oral podrá ser dado de alta hospitalaria. Generalmente no es necesario hacer noche en el hospital.



**MIGUEL RODRIGO**  
UROLOGÍA

Dr. Miguel Rodrigo Aliaga  
C/ Alicante 25.  
12004. Castellón de la Plana.

☎ 964 10 48 40 (IVU)

[www.rodrigourologo.es](http://www.rodrigourologo.es)  
[info@rodrigourologo.es](mailto:info@rodrigourologo.es)

## **¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR EN MI DOMICILIO DESPUES DE LA INTERVENCION?**

Deberá guardar reposo sexual y evitar ejercicio físico durante 8 semanas, así como la realización de esfuerzos domésticos.

El cuidado diario de las heridas externas lo podrá realizar con agua y jabón, y aplicar posteriormente betadine o Clorhexidina.

Los puntos caerán solos en aproximadamente 3-4 semanas.

Si presenta dolor durante el postoperatorio podrá tomar Paracetamol o Metamizol (si no es alérgico).

Todas estas recomendaciones aquí reflejadas son genéricas y puede que no sean las adecuadas para su caso en particular. Por todo ello, en el informe del alta hospitalaria es donde se redactarán las recomendaciones específicas que usted deberá seguir una vez esté en su domicilio.